

Maklumat Komoditi : Belimbing

Sistem Pembajaan

Pokok belimbing cepat mengeluarkan hasil dan berbuah sepanjang tahun. Oleh sebab itu tanaman ini memerlukan jumlah baja yang agak tinggi bermula pada peringkat awal umur lagi. Penggunaan bahan organan sangat digalakkan untuk tanaman belimbing kerana selain daripada menambah baja kimia ianya juga memelihara kesuburan tanah dan membaiki mutu hasil.

Bekalan kapur tidak perlu diberikan jika pH tanah > 5.5 . Masa kritikal pembajaan untuk tanaman buah-buahan :

1. 1 bulan sebelum berbunga
2. Semasa mula berputik (besar bola pingpong)
3. Selepas Mengutip Hasil

Pengapuran perlu dijalankan jika pH tanah rendah dan pengapuran biasanya dilakukan semasa pembajakan supaya boleh digaulkan ke dalam tanah 1–2 minggu sebelum menanam. Elakkan pengapuran dilakukan bersama-sama pembajaan kimia. Bahan pengapuran ialah seperti batu kapur halus (36 % kalsium) dan batu kapur magnesium (GML 21 % dan 12 % Mg). Kuantiti kapur yang diperlukan untuk jenis tanah yang berbeza adalah seperti di **Jadual 8**.

Jadual 8 : Keperluan Kapur

Nilai pH	Kadar Pengapuran (tan/hektar)
> 5.5	-
5.0 – 5.5	2.5
4.5 – 5.0	5.0
< 4.5	7.5 *

* 7.5 tan/ hektar untuk dua kali pengapuran